

**Перед применением внимательно прочитайте!**

**Рекомендации по применению препарата**

## **ФИТОВЕРМ<sup>®</sup>, КЭ**

(2 г/л аверсектина С)

концентрат эмульсии

**Средство для борьбы с грызущими и колюще-сосущими насекомыми-вредителями**

**Рекомендуемые нормы расхода и способ применения:** норму расхода препарата, в соответствии с указаниями в таблице, растворить вначале в небольшом количестве воды, затем при непрерывном помешивании добавить оставшуюся воду до требуемого объема. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, утром (до 10 часов) или вечером (18-22 часа), равномерно смачивая листья. Не рекомендуется проводить опрыскивание перед дождем. *Рабочий раствор хранению не подлежит!* Оптимальная температура при обработках не ниже 18° С, равномерно смачивая листья.

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки, расход рабочей жидкости	Срок ожидания (кратность)
Капуста	4 мл/ 1 л воды	Капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором. <b>Расход – 4 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	2 (1-2)
Смородина, малина, ежевика	2 мл/ 1 л воды	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором. <b>Расход – 1 л/куст.</b>	2 (2)
	1,5 мл/ 1 л воды	Пяденицы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочим раствором. <b>Расход – 1 л/куст.</b>	
Яблоня	1,5 мл/ 1 л воды	Паутинный и красный плодовый клещи, клещ Шлехтендаля, листовертки, бурополосая пяденица	Опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочим раствором. <b>Расход – от 2 до 5 л/дерево</b> (в зависимости от возраста и сорта дерева).	2 (2)
	2 мл/ 1 л воды	Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором. <b>Расход – от 2 до 5 л/дерево</b> (в зависимости от возраста и сорта дерева).	2 (1)
Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта	1 мл/ 1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочим раствором с интервалом 20 дней. <b>Расход – 10 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	2 (2)
	4-6 мл/1 л воды	Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации 0,8% рабочим раствором с интервалом 15 дней. <b>Расход – 10 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	2 (2-3)
	10 мл/ 1 л воды	Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором с интервалом 20 дней. <b>Расход – 10 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	Томаты 3 (2-3)
Цветочные культуры защищенного грунта	2 мл/ 1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором с интервалом 20 дней. <b>Расход – 10 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	2 (2-3)
	4 мл/ 1 л воды	Зеленая розанная тля	Опрыскивание вегетирующих растений 0,4% рабочим раствором с интервалом 14-16 дней. <b>Расход – 10 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	
	8 мл/ 1 л воды	Калифорнийский трипс	Опрыскивание растений в период цветения 0,8% рабочим раствором, последовательные обработки с интервалом 7 дней. <b>Расход – 10 л/100 м<sup>2</sup>.</b>	
Комнатные растения	2 мл/1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. <b>Расход- 0,1-0,2 л/ м<sup>2</sup>.</b>	2(2-4)
	2 мл/0,25 л воды	Тли		
	2 мл/0,2 л воды	Трипсы		
Цветочные культуры открытого грунта	2 мл/ 1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. <b>Расход- 10 л/ 100 м<sup>2</sup>.</b>	
	2 мл/0,25 л воды	Тли		
	2 мл/0,2 л воды	Трипсы		
Декоративны культуры	2 мл/ 1 л воды	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором с интервалом 20 дней.	1 (1-3)

**Сроки выхода для ручных работ:** через 1-3 дня

**Период защитного действия:** 7-20 дней. Не фитотоксичен в рекомендуемых нормах.

**Возможность возникновения резистентности:** за время использования препарата не выявлена.

**Совместимость с другими пестицидами:** не смешивать с другими препаратами при применении в личном подсобном хозяйстве.

**Класс опасности:** III - умеренно опасное вещество.

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны:** класс опасности для пчел - 2 - среднеопасный пестицид. Проводить обработку растений в утренние и вечерние часы; при скорости ветра до 2-3 м/с; погранично-защитная зона для пчел - не менее 3-4 км; ограничение лета пчел - 48-72 часа. Не допускать попадания в водоемы и водные источники!

**Первая помощь при отравлении:** при попадании препарата на кожу - снять ватой или куском ткани, обмыть кожу водой с мылом; при попадании препарата в глаза - промыть большим количеством воды в течение 15 минут, стараясь держать веки открытыми; при вдыхании препарата - обеспечить доступ свежего воздуха; при случайном попадании препарата в организм человека - принять 2-3 стакана воды с 4-5 таблетками активированного угля на стакан воды. Вызвать рвоту. Если пострадавший потерял сознание, то запрещается вводить лекарства и вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.

**Информация для врача:** антидота нет. Лечение симптоматическое. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр Росздравнадзора»: 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.

**Меры предосторожности:** для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду! Обработку проводить в отсутствие детей и животных. Работать в специально предназначенной для этой цели одежде. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы лицо и руки вымыть с мылом, прополоскать рот водой.

**Обезвреживание остатков препарата и тары:** используемые для приготовления рабочего раствора емкости и детали опрыскивателя промыть большим количеством воды. Остатки препарата и освободившуюся упаковку сжечь,

**Хранить** отдельно от лекарств и пищевых продуктов в сухом, недоступном для детей и животных месте при температуре от - 20° С до +30° С.

**Номер государственной регистрации:** 01-0617-0111-1

**Регистрационный номер тарной этикетки:** 12-040 (4 мл)

**ТУ 9291 -002-17266133-95, ГОСТ Р 51247-99**

**Объем упаковки:** 4 мл (ампула)

**Срок годности:** 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**Дата изготовления:** см. на упаковке

**Изготовитель** ЗАО Фирма "Август", Россия

**Произведено** из препарата Фитоверм, КЭ ООО НБЦ "Фармбиомед", Россия.

**Юридический адрес:** Россия, 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.3.

**Офис:** Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, [www.firm-august.ru](http://www.firm-august.ru)

**Склад:** 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон Силикат, промзона, стр. 4., тел. (495)647-07-49

**ФИТОВЕРМ®**- зарегистрированный товарный знак ООО НБЦ "Фармбиомед", Россия.